

۳۴- مقایسه تأثیر شیاف واژینال لاکتوباسیل با قرص واژینال مترونیدازول در درمان بیماران مبتلا به واژینوز باکتریال

حمیده جعفرزاده، ریحانه ایوان بقاء، داود حسن زاده، محمد حسین سروش برحقی، منیژه سیاح ملی، اصغر محمدپور اصل

حمیده جعفرزاده: کارشناس ارشد مامایی jafarzadeh_ob@yahoo.com

ریحانه ایوان بقاء: کارشناس ارشد مامایی،

دکتر داود حسن زاده: دکترای فارماسیتوتیکس، استاد دانشکده داروسازی تبریز

محمد حسین سروش برحقی: کارشناس ارشد میکروپ شناسی، دانشکده پزشکی تبریز

دکتر منیژه سیاح ملی: متخصص زنان و زایمان، استاد دانشکده پزشکی تبریز

دکتر اصغر محمدپور اصل: دانشجوی دکترای اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت و تغذیه تبریز

مقدمه:

واژینوز باکتریال نوعی عدم تعادل در اکوسیستم طبیعی واژن است. که به علت رشد بیش از حد باکتریهای غیر هوازی و همراهی آنها با کاهش لاکتوباسیل ها بوجود آمده و pH واژن به بیش از ۴/۵ افزایش می یابد. واژینوز باکتریال خطر بیماری های التهابی لگن، عفونت های کاف واژن متعاقب هیستریکتومی، غیر طبیعی بودن سیتولوژی سرویکس و زایمان پره ترم را افزایش می دهد. مقاومت به آنتی بیوتیک ها، سبب افزایش علاقه به درمانهای غیر آنتی بیوتیکی شده است. دو روش غیر آنتی بیوتیکی درمان عبارتند از: ۱- درمانهای پروبیوتیکی: فراهم کردن باکتریها به عنوان مکمل جهت اصلاح لاکتوباسیل واژن ۲- اصلاح با درمانهای اسیدی مانند ژل بافر. هدف: مطالعه حاضر با هدف مقایسه تأثیر شیاف واژینال لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس با قرص واژینال مترونیدازول بر علایم و نشانه های واژینوز باکتریال انجام شد.

مواد و روشها: این کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور، در مراکز درمانی سرپایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال ۱۳۸۷ انجام شد. ۴۰ بیمار با تخصیص تصادفی در دو گروه شیاف لاکتوباسیل و قرص واژینال مترونیدازول قرار داده شدند.

یافته ها: میزان بهبود در گروه مترونیدازول ۱۰۰٪ و در گروه لاکتوباسیل ۷۵٪ مشخص شد ($p=0.017$).

بحث و نتیجه گیری: بر پایه نتایج مطالعه، مترونیدازول در درمان واژینوز باکتریال موثرتر می باشد. شاید بتوان ترکیبی از هر دو رژیم درمانی را در اغلب بیماران مقاوم به درمان بکار برد. کلید واژه: واژینوز باکتریال، شیاف واژینال لاکتوباسیل، قرص واژینال مترونیدازول

۳۵- بررسی همبستگی ازدواج فامیلی با پیامدهای بارداری در زنان مراجعه کننده به بیمارستان-

های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اهواز سال ۱۳۸۹

* مژگان حق پرست^۱، ماهرخ دولتیان^۲، علی محمد فروغ مند^۳، عبدالرحمن راسخ^۴

^۱ مربی هئیت علمی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز *

^۲ مربی هئیت علمی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

^۳ استادیار گروه ژنتیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران

^۴ استاد گروه آمار، دانشکده ریاضی، دانشگاه شهید چمران

نشانی نویسنده مسئول: اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، دانشکده پرستاری و مامایی، مژگان حق پرست

Email: mozghan.haghparsat@gmail.com

محل سکونت: اهواز-کیان آباد خیابان ۱۸ شرقی پلاک ۳-کدپستی ۴۹۳۹۸-۶۱۵۵۷

زمینه و هدف:

درباره اثرات ازدواج فامیلی بر تولیدمثل زنان نتایج بحث‌انگیزی در دست است. فرزندان پیوند-های فامیلی، برای ال‌های خاصی، هموزیگوت می‌شوند بنابراین بیماری‌های اتوزمال مغلوب که می‌تواند کشنده و یا معلولیت‌آور باشند، در آنها شایعتر است. این مطالعه با هدف بررسی همبستگی ازدواج فامیلی با پیامدهای بارداری صورت پذیرفت.

مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی مقایسه‌ای از نوع همبستگی بود که بر روی ۱۷۵۷ زن باردار انجام شد. روزهای مراجعه به بیمارستان به صورت تصادفی انتخاب شد و نمونه‌گیری توسط پرسش‌نامه‌ای محقق ساخته بطور مستمر ادامه یافت.